

# 单选

1. 我院护理管理构架体系 (A)

- A. 院-科部-病区
- B. 护理部-病区
- C. 科部-病区
- D. 病区-科部-院
- E. 病区-科部

2. 交叉配血时，血标本采集量少于多少将导致拒收标本：(A)

- A. 2ml
- B. 3ml
- C. 4ml
- D. 5ml

3. 分级护理制度中以下描述错误的是 (D)

- A. 依据《护理分级》(WS/T431-2013), 制定符合医院与专科实际的护理分级制度
- B. 对护理分级相关制度有培训与考核，并落实
- C. 科室对护理分级制度落实情况定期进行自查，对存在问题有改进措施
- D. 主管部门对护理分级制度落实情况可无检查与监管
- E. 持续改进有成效，根据患者病情与自理能力确定级别护理，并落实到位

4. 健康教育的核心问题是改变个体和群体的 ( C )

A. 知识

B. 态度

C. 行为

D. 价值观

5. 新冠肺炎患者早起主要的临床表现为 (A)

A. 发热、干咳、乏力为主

B. 发热、乏力、嗅觉、味觉减退为主

C. 发热、干咳、乏力及嗅觉减退为

D. 发热、乏力及味觉减退为主

E. 发热、咽痛及味觉减退为主

6. 请问 Branden 评分表中, 属于高度危险的是 (C)

A. 15-18 分

B. 13-14 分

C. 10-12 分

D. < 9 分

7. 哪些岗位的护理人员需要取得特殊岗位资质 (D)

A. 康复科

B. 手术室

C. 介入科

D. 高压氧

E. 中医科

8. 从血库取回的血液制品应该在多少时间内开始输注 (B )

A. 20min

B. 30min

C. 15min

D. 60min

9. 关于抢救设备及药品管理，下列描述错误的是 (B)

A. 科室应有保障常用仪器、设备和抢救药品使用的制度与流程

B. 护理人员应基本掌握急救设备的使用

C. 主管部门对护理人员的培训和设备操作能力有检查与监管

D. 科室要建立自查，对存在问题有改进措施

10. 护理健康教育的主体是 (D)

A. 病人

B. 家属

C. 医生

D. 护士

11. 医用防护口罩的效能持续应用时间 (B)

A. 4 小时

B. 6-8 小时

C. 大于 8 小时

D. 4-6 小时

E. 6 小时

12. 对患者进行压力性损伤活动评估能力时，患者局限于轮

椅活动，没有行走能力，其活动能力评分为 (B)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

13. 按照医院各科室工作性质，合理配置护理人员，新生儿病区床护比配置正确的是 (B)

A. 1: 0.4

B. 1: 0.6

C. 1: 0.8

D. 1: 1

E. 1: 1.5

14. 输液治疗的感染控制和护理安全描述错误的是 (D)

A. 输液治疗时必须严格执行无菌技术操作规程，执行标准预防措施

B. 使用手套不能代替洗手

C. 为减少针刺伤的发生，选用防针刺伤的穿刺器具

D. 消毒剂用无菌棉签擦拭干净方可穿刺

15. 下列关于输血查对制度说法错误的是 (C)

A. 取血时应和血库发血者共同查对

B. 输血前必须经二人核对无误后方可执行，并在医嘱单、交

叉配血单、输血单上签全名

C. 输血过程中注意输血反应、输血完毕应保留血袋 4-48 小时，以备必要时查对。将血袋上的条形码粘贴于交叉配血报告单上，入病例保存

D. 取血时应做到三查八对，在确定无误后方可取回

**16. 下面哪项不是进行健康教育必须拥有的前提 (C)**

A. 改变行为所需的知识

B. 技能及相关服务

C. 良好的心态

D. 合理运用服务

**17. 新冠病毒的主要传染源是感染的患者和无症状感染者，在潜伏期既有传染性，发病后 (A) 天内传染性较强**

A. 5 天

B. 7 天

C. 10 天

D. 12 天

E. 14 天

**18. 压力性损伤高危患者提供的护理措施错误的是 (D)**

A. 使用气垫床

B. 每 2 H 翻身 1 次

C. 管理好大小便失禁

D. 保暖

E. 床单元平整整洁

19. 护理人员每年需按层级完成院级在职教育培训，以下正确的是 (D)

A. N1 级不少于 10 次

B. N2-N3 级不少于 8 次

C. N4 级不少于 6 次

D. N1 级不少于 8 次

E. N4 级至少 2 次

20. 血小板输注时间应 (A)，一般为每分钟 80-100 滴

A. 快

B. 慢

C. 无特殊要求

D. 随意

21. 高警示药品常用标识是 ( A )





D

22. 以下哪类人员不得独立使用高警示药品（ D ）

A 实习期护士

B 实习护士

C 进修护士

D 以上三类

23. 高警示药品发放时要进行（ B）以确保发放准确无误

A 随意拿取

B 双人复核

C 无需核对

D 自取自对

24. 病区抢救车急救药品常备的药品有（ A ）。

A 肾上腺素

B 胰岛素

C 利多卡因

D 阿托品

25. 下列哪项属于严重不良反应：（ C ）

A. 皮疹

B. 过敏样反应

C. 过敏性休克

D. 失眠

26. 使用除颤仪的时候，下列描述正确的是（ B ）

- A、除颤仪不必自检，直接使用
- B、不能用超声耦合剂，只能使用导电膏
- C、每天都需要主动做检测
- D、电池报废可以忽视

27. 哪个是心率起源（ A ）

- A、窦房结
- B、房室结
- C、房室束
- D、浦肯野氏纤维

28. 黄金急救时间是（ C ）

- A、10 分钟
- B、6 分钟
- C、4 分钟
- D、8 分钟

29. 监护仪心电监测电极片最长使用时间（ A ）

- A、24 小时
- B、48 小时
- C、12 小时
- D、18 小时

30. 成人监护仪血氧附件不包含（ B ）

- A、血氧主电缆



- B、绑带式血氧传感器
- C、指夹式血氧传感器
- D、指套式血氧传感器

## 多选

### 1. 我院护理质控与安全管理委员会的职责（ABD）

- A. 定期研究护理质量与安全工作
- B. 制定护理质量与安全管理工作计划
- C. 决定科部层面质量管理小组人员名单
- D. 制定护理质量监测指标
- E. 每季度对护理质量与安全管理问题进行分析

### 2. 下列属于高风险药物的有（ABCD ）

- A. 10%氯化钾
- C. 胰岛素
- D. 肝素钠
- E. 肝素钙
- F. 5%葡萄糖注射液

### 3. 危急值报告制度与流程描述正确的是（ACDE）

- A. 医技科室相关人员按照危急值报告流程，及时向临床发出危急值信息
- B. 医护人员接获危急值报告后应记录患者信息、危急值内容，及时向值班医师报告

- C. 医师接到危急值报告后应及时处置并记录
- D. 主管部门对危急值报告有检查与监管
- E. 持续改进有成效，危急值处理及时、记录规范

**4. 新型冠状病毒感染病人出院护理的健康宣教不正确的有（BC）**

- A. 选择合适的呼吸康复锻炼方式，摄入高蛋白、含多种维生素和矿物质、高热量饮食
- B. 如无发热、咳嗽、咽痛、胸闷等不适症状无需复诊
- C. 提醒继续进行 28d 隔离医学观察
- D. 不具备居家隔离条件者，在当地集中隔离点进行 14 天集中隔离医学观察
- E. 有发热、咳嗽、咽痛、胸闷等不适症状立即就诊

**5. 下列哪些条件符合申报难免性压力性损伤（ABCDE）**

- A. Braden 评分 $\leq$ 12 分
- B 呼吸衰竭、心力衰竭、肝功能衰竭
- C 偏瘫 / 高位截瘫 / 四肢瘫痪
- D 高龄 ( $\geq$ 70 岁)、血清白蛋白 $\leq$ 30g/L
- E 极度消瘦、高度水肿

**6. 住院健康教育包括（ ABCD ）**

- A. 入院教育
- B. 手术前教育
- C. 手术后教育
- D. 出院教育

E. 门诊教育

7. 取血时，出现下列哪些情况不得取回血液制品（ABCDE）

A. 血袋标签不清

B. 血液有凝块

C. 红细胞层呈紫红色

D. 血浆呈乳糜状

E. 血浆呈暗灰色

8. 下列关于分级护理制度说法错误的是（BCD）

A. 特级护理是指病情危重，随时可能发生病情变化需要抢救的患者

B. 一级护理是指病情稳定仍需卧床且自理能力轻度依赖的患者

C. 二级护理是指病情趋向稳定的重症患者

D. 三级护理是指病情处于康复期且自理能力中度依赖的患者

9. 新型冠状病毒主要传播途径为经（ABCDE）

A. 呼吸道飞沫

B. 密切接触传播

C. 接触病毒污染的物品也可造成感染

D. 在相对封闭的环境中长时间暴露于高浓度气溶胶情况下存在经气溶胶传播的可能

E. 含有病毒的飞沫在物体的表面，接触污染后，用接触的手触摸口腔、鼻腔、眼睛等粘膜导致的感染

10. 压力性损伤高危患者，在什么情况下，需要 Branden 评分复评（ABDE）

- A. 癫痫患者使用镇静后
- B. 手术返回病房的患者
- C. 体温 $>38.5^{\circ}\text{C}$ 发热的患者
- D. Braden 评分 $<8$ 分的患者
- E. ICU 转入普通病房的患者

### 11. 护理人员绩效分配基于哪些方面 (ABC)

- A. 护理工作数量与质量
- B. 患者满意度
- C. 护理难度与技术要求
- D. 每月护理质量督查结果
- E. 护理部考试考核成绩

### 12. 发生输液反应时，应该 (ABCE)

- A. 立即撤除所有液体，更换液体和输液器
- B. 报告主管医生，遵医嘱抢救
- C. 记录患者生命体征及抢救过程及时汇报护士长、主任
- D. 及时丢弃液体
- E. 按要求填写药品不良反应表及不良事件表

### 13. 下列选项正确的是 (CD)

- A. 若数个单位的脂肪乳在 1d 内间歇输入，那输液装置没 12h 更换一次
- B. 在输液器没有的情况下，可以考虑用输血器代替输液器

C. 对输液接头进行消毒时必须要有有一定的擦拭力量

D. 紫杉醇不能使用 PVC 材质的输液器

14. 如果患者有药物过敏史，应分别在（ ABCDE ）进行标注

A. 入院评估单

B. 病区诊断牌

C. 患者病历牌

D. 患者床头牌

E. 患者腕带

15. 以下关于高警示药品的管理，正确的是(BCD )

A. 不需要建立高警示药品目录

B. 单独存放，不得混放

C. 警示标识醒目

D. 取药前准确四查十对

16. 住院病区原则上不存放高警示药品，如确有需要应做到（ABCD）

A. 高警示药品清单

B. 单独存放

C. 统一标识

D. 使用时双人核对

17. 下列哪项是正确的（ABCD ）

A 警示标识牌：贴于高警示药品存放药架、药柜。

B 警示标签：小标签，需要时可贴药品外包装上。

- C 高警示药品标签：显示药品名称、规格。
- D 高警示药品专用袋：药房发放高警示药品时使用。

18. 下列哪项不是致命心律失常？（ CD ）

- A、室颤/速
- B、停搏
- C、漏博
- D、起搏器未起搏/俘获

19. 无心电或心电不出波形的处理方法有（ ABCD ）

- A、确认监护仪导联模式是否正确
- B、病人皮肤处理是否符合要求
- C、确认电极片是否贴好
- D、确认心电导联线是否完好

20. 监护仪上哪些参数能直接或间接反映出脉率（或心率）（ ABCD ）

- A、SP02
- B、NIBP
- C、IBP
- D、ECG