

三甲评审“应知应会”考试——医疗组（四）

一、单项选择题（共 30 题，每题 2 分）

1、发生职业暴露后，会根据接触疾病的性质进行定期检测及随访，以下疾病追踪时间错误的是（ D ）。

- A. 乙肝：暴露后当天、3 个月、6 个月追踪。
- B. 丙肝：暴露后当天、4 周、3 个月、6 个月追踪。
- C. 梅毒：暴露后当天、4 周、3 个月追踪。
- D. 艾滋病：暴露后当天、4 周、8 周、3 个月、6 个月追踪。

2、医务人员暴露于乙肝污染血后，首先采取的处理措施是（ A ）

- A. 挤压伤口并用流动水冲洗
- B. 用 0.5%碘伏消毒伤口
- C. 报告护士长
- D. 报告公共卫生管理科

3、世界卫生组织提出的国际洗手日为哪一天？（ C ）

- A. 10 月 5 日
- B. 10 月 10 日
- C. 10 月 15 日
- D. 10 月 25 日

4、手卫生正确性判断中，揉搓方法主要是指（ A ）

- A. 洗手、手消均遵循“内、外、夹、弓、大、立、腕”
- B. 先搓手心，再搓手背
- C. 双手相互揉搓
- D. 快速、均匀地揉搓

5、手卫生正确性根据哪三点判断（ C ）

- A. 揉搓力度、揉搓时间、干手方法
- B. 揉搓方法、揉搓时间、干手时间
- C. 揉搓方法、揉搓时间、干手方法
- D. 揉搓方法、揉搓部位、干手方法

6、手卫生正确性判断中，揉搓时间主要是指（ B ）。

A. 洗手时间不少于 40-60s

B. 洗手时间不少于 40-60s，快速手消时间不少于 20-30s

C. 快速手消时间不少于 20-30s

D. 揉搓干净即可

7、特殊级抗菌药物需经（ A ）会诊后，医师方可开具。

A. 抗感染或临床药师会诊 B. 副主任医师

C. 主任医师 D. 科主任

8、（ B ）抗菌药物是指经过长期临床应用证明安全、有效，对细菌耐药性影响较小，价格相对较低的抗菌药物。

A. 限制级 B. 非限制级

C. 特殊级 D. 常用级

9、非限制级抗菌药物需要（ D ）开具。

A. 主治医师以上 B. 副主任医师以上

C. 主任医师以上 D. 住院医师以上

10、心电图上 U 波明显增高临床上见于：（ C ）

A. 高血钾 B. 高血钙 C. 低血钾 D. 低血钙 E. 低血镁

11、右房肥大的心电图表现为：（ D ）

A. P 波高而宽 B. P 波增宽 C. P 波出现切迹

D. P 波尖锐高耸 E. P 波呈双峰状

12、关于心电图的价值，下列哪项不正确？（ E ）

A. 能确诊心律失常 B. 能确诊心肌梗塞

C. 辅助诊断房室肥大 D. 辅助诊断电解质紊乱

E. 能反映心动能状态

13、在心电图上 P 波反映的是：(C)

- A. 窦房结除极 B. 窦房结复极 C. 心房除极
D. 心房复极 E. 房室结除极

14、下列哪个是肠外营养的缩写 (B)。

- A. EN B. PN C. TPN D. LP

15、QRS 波在正常心电图中，下列描那相是正确的 (D)

- A. QRS 波代表心房肌复极的电位变化
B. QRS 波代表心房肌除极的电位变化
C. QRS 波代表心室肌复极的电位变化
D. QRS 波代表心室肌除极的电位变化

16、清洁-污染手术和污染手术的预防用药时间为 (B) 小时，污染手术必要时延长至 () 小时，过度延长用药时间并不会进一步提高预防效果。

- A. 12, 24 B. 24, 48 C. 12, 36 D. 24, 72

17、对于抗菌药物培训考核不合格的医师，其所在医疗机构应 (B)

- A. 取消其处方权 B. 取消其抗菌药物处方权
C. 重新培训 D. 限期补考

18、医疗机构应当严格控制申请临时采购抗菌药物的品种和数量，三级医疗机构可以采购 (A) 个品种。

- A. 50 B. 40 C. 35 D. 25

19、下列哪句话是正确的 (B)

- A. 戴手套前需进行手卫生，摘除手套之后无需进行手卫生
- B. 戴手套前、摘除手套之后均应进行手卫生
- C. 戴手套前无需进行手卫生，摘除手套之后无需进行手卫生
- D. 戴手套前无需进行手卫生，摘除手套之后需进行手卫生

20、自 2020 年 6 月 1 日起，我国执行的手卫生规范是？（ A ）

- A. WS/T313-2019
- B. WS/T313-2009
- C. WS/T313-2006

21、新规范中，外科冲洗手消毒的时间和外科免冲洗手消毒的时间要求是（ A ）。

- A. 3-5min, 10-15s
- B. 1-2min, 10-15s
- C. 40-60s, 20-30s

22、新规范中，外科免冲洗手消毒方法要求指尖浸泡在手消毒剂中（ A ）

- A. $\geq 5s$
- B. $> 5s$
- C. $\geq 10s$
- D. $> 10s$

23、多重耐药菌患者采取的隔离措施是（ C ）

- A. 标准预防+空气隔离
- B. 标准预防+飞沫隔离
- C. 标准预防+接触隔离
- D. 标准预防+严密隔离

24、紫外线灯管使用时间累积应不超过（ D ）小时。

- A. 100
- B. 200
- C. 500
- D. 1000

25、下列物品中不属于医疗废物是哪种？（ B ）

- A. 使用后的一次性医疗器械
- B. 使用后的（一次性塑料）输液瓶（袋）
- C. 过期消毒剂
- D. 病理标本

26、《医疗废物管理条例》中所称的医疗废物是指什么？（ B ）

- A. 医疗卫生机构在医疗、预防、保健活动中产生的危害性的废物
- B. 医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物
- C. 在医疗、预防、保健活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害性的废物
- D. 在日常公益活动中产生的废物

27、隔离的实施应遵循（ C ）和基于疾病传播途径的预防的原则。

- A. 血液体液隔离
- B. 严密隔离
- C. 标准预防
- D. 普遍预防

28、进行诊疗护理操作时，可能发生血液、分泌物喷溅时执行标准防护措施包括哪些防护用品的使用（ D ）。

- A. 口罩、帽子
- B. 口罩、帽子、手套
- C. 口罩、帽子、手套、防护面罩
- D. 口罩、帽子、手套、防护面罩、隔离衣

29、MRSA肺部感染者如不能单间放置最好与下列哪类病人同室安置？
（ D ）

- A. 昏迷患者
- B. 气管切开患者
- C. 开放性创口患者
- D. MRSA 尿路感染患者

30、飞沫传播是一种近距离传播，近距离是（ A ）

- A. 1 米以内
- B. 1.2 米以内
- C. 1.5 米以内
- D. 2 米以内

二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分）

1、一个积分周期内累积不良积分 ≥ 20 分时，医师可被给予何处理(BCD)

- A. 延迟 1 年晋升
- B. 延迟 3 年晋升

C. 定期考核不合格 D. 低聘、解职待聘、解聘

2、以下说法正确的是(AC)。

A. 不良执业积分 2 年为一个积分周期

B. 不良执业积分 3 年为一个积分周期

C. 年度累计不良执业积分 ≥ 6 分时，年度考核不能评为优秀

D. 一个积分周期内累积 10 分，延迟 1 年晋升

3、下列有关“危急值”报告时限正确描述是(BC)。

A. 检验(查)科室 15 分钟内报告科室护理人员

B. 科室护理人员 10 分钟内报告主管医师

C. “危急值”病程记录应该在接到报告的 4 小时内完成

D. “危急值”病程记录应该在接到报告的 24 小时内完成

4、以下属于病历三级质控人员或部门有(ACD)。

A、主管医师 B、科主任 C、医疗督查科 D、病案科

5、传染病信息报告描述正确的是(ABD)

A. 首诊医生负责制。

B. 一个病人同时患有两种法定传染病时应填写两张传染病报告卡。

C. 一个病人同时患有两种法定传染病时应填写一张传染病报告卡。

D. 报告流程：HIS 系统—诊疗—传染病上报—补充信息—报卡。

6、发现传染病应该做到(ABCDE)。

A. 早发现 B. 早报告 C. 早隔离 D. 早诊断 E. 早治疗

7、单纯手足口病主要表现是(ABCD)等部位出现斑丘疹及疱疹。

A. 手 B. 足 C. 口腔粘膜 D. 臀部

8、关于麻疹病例描述正确的是(ABD)。

A. 将具有发热、出疹，并伴有咳嗽、卡他性鼻炎或结膜炎症状之一的

病例，均按照麻疹疑似病例进行报告及管理

B. 不得将符合麻疹定义的病例按照“病毒性皮疹”或“病毒疹”等处理，造成麻疹病例的漏报

C. 疑似麻疹病例可以诊断为“病毒性皮疹”

D. 需采集的标本为无抗凝剂血液 3ml 和咽拭子标本

9、以下疾病属于乙类传染病的是（ ABC ）

A. 菌痢 B. 乙脑 C. 麻疹 D. 手足口病

10、属于其他重点监测的传染病是（ ABCD ）

A. 水痘 B. 结核性胸膜炎 C. 不明原因肺炎 D. MERS

11、属于乙类传染病但按甲类管理传染病的是（ ABCD ）

A. 非典 B. 新冠肺炎 C. 人感染高致病性禽流感 D. 肺炭疽

12、流行性感冒主要有以下临床症状（ ABCD ）

A. 发热 B. 头痛 C. 全身酸痛 D. 软弱无力

13、艾滋病职业暴露处理流程正确的是（ ABCD ）

A. 立即用肥皂液和流动水清洗污染的皮肤，用生理盐水冲洗黏膜

B. 如有伤口，应在伤口旁端轻轻挤压，尽可能挤出损伤处的血液，再用肥皂液和流动水进行冲洗，禁止进行伤口的局部挤压

C. 受伤部位的伤口冲洗后，用消毒液如 75%乙醇或 0.5%碘伏进行消毒，并包扎伤口

D. 尽快脱掉污染的衣物，进行消毒处理

14、手术过程中，发生缝针刺破手指部位，处理正确的是（ ABCD ）

A. 保持镇静，按常规脱去手套

B. 立即用肥皂液和流动水清洗污染的皮肤，用生理盐水冲洗黏膜

C. 如有伤口，应在伤口旁端轻轻挤压，尽可能挤出损伤处的血液，再

用肥皂液和流动水进行冲洗

D. 受伤部位的伤口冲洗后，用消毒液如 75%乙醇或 0.5%碘伏进行消毒，并包扎伤口

15、为防针刺伤，正确诊疗操作是：（ABC）

A. 使用后的锐器直接放入耐刺、防渗漏的利器盒

B. 利用针头处理设备进行处理

C. 使用具有安全性能的注射器、输液器等医用锐器，以防刺伤

D. 将针套套回针头，以防扎伤别人

16、医务人员实施诊疗护理操作中，有可能接触多重耐药菌感染患者或者定植患者的哪些时，应当使用手套，必要时使用隔离衣？（ABCD）

A. 溃烂面 B. 血液和体液 C. 分泌物 D. 伤口

17、对患者经常接触的物体表面、设备设施表面如何处理？（AB）

A. 应当每天进行清洁和擦拭消毒。

B. 出现或者疑似有多重耐药菌感染暴发时，应当增加清洁和消毒频次。

C. 仅用清水擦拭

D. 没必要处理

18、医务人员在何种情况下都应当实施手卫生？（ABCD）

A. 直接接触患者前后

B. 接触患者体液或者分泌物后

C. 接触患者使用过的物品后

D. 摘掉手套后

19、医疗机构应当加强对那些细菌实施目标性监测（ABCD）

A. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）

- B. 耐万古霉素肠球菌（VRE）
- C. 产超广谱 β -内酰胺酶（ESBLs）的细菌
- D. 多重耐药的鲍曼不动杆菌

20、医疗机构应当对多重耐药菌感染的患者和定植患者实施隔离措施（ ABD ）。

- A. 首选单间隔离
- B. 可以将同类多重耐药菌感染患者或者定植患者安置在同一房间
- C. 患者安置无特殊要求
- D. 不能将多重耐药菌感染患者或者定植患者与气管插管、深静脉留置导管、有开放伤口或者免疫功能抑制患者安置在同一房间。